ІНСТРУКЦІЯ
Інформація для споживача

ЛІВОДІНОЛ®

ДІЄТИЧНА ДОБАВКА

ДО 1 ЧЕРВОНОЇ КИШКОВОРОЗЧИННОЇ КАПСУЛИ ВХОДЯТЬ:
S-аденозил-L-метіонін (з S-аденозил-L-метіонін дисульфату тосилату) - 250 мг.

СКЛАД
S-аденозил-L-метіонін (з S-аденозил-L-метіонін дисульфату тосилату), наповнювачі: мікрокристалічна целюлоза та карбонат кальцію, стабілізатор: натрію карбоксиметилцелюлоза трьохмірна (натрію кроскармелоза); крохмаль картопляний, антиспікаючі агенти: діоксид кремнію, кальцієві солі жирних кислот (кальцію стеарат); оболонка капсули: желатин.

ДО 1 БІЛОЇ КИШКОВОРОЗЧИННОЇ КАПСУЛИ ВХОДЯТЬ:
N-ацетилцистеїн (N-Acetylcysteine) - 250 мг; глутатіон (Glutathione) - 200 мг.

СКЛАД
N-ацетилцистеїн (N-Acetylcysteine), глутатіон (Glutathione), наповнювачі: мікрокристалічна целюлоза та карбонат кальцію, стабілізатор: натрію карбоксиметилцелюлоза трьохмірна (натрію кроскармелоза); антиспікаючі агенти: діоксид кремнію, кальцієві солі жирних кислот (кальцію стеарат); оболонка капсули: желатин.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСНОВНІ ІНГРЕДІЄНТИ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ
Кількість в 1 червоній кишковорозчинній капсулі (рекомендована добова порція) та референсні величини добового споживання (%):

ІНГРЕДІЄНТ	КАТЕГОРІЯ ІНГРЕДІЄНТА	1 КАПСУЛА (КАП.)	% В 1 КАП.
S-аденозил-L-метіонін (з S-аденозил-L-метіонін дисульфату тосилату)	речовина з поживним/ фізіологічним ефектом	250 мг	–

«–» референсну (рекомендовану) величину споживання не встановлено.

Кількість в 1 білій кишковорозчинній капсулі (рекомендована добова порція) та референсні величини добового споживання (%):

ІНГРЕДІЄНТ	КАТЕГОРІЯ ІНГРЕДІЄНТА	1 КАПСУЛА (КАП.)	% В 1 КАП.
N-ацетилцистеїн (N-Acetylcysteine)	амінокислота	250 мг	–
Глутатіон (Glutathione)	речовина з поживним/ фізіологічним ефектом	200 мг	–

«–» референсну (рекомендовану) величину споживання не встановлено.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО СПОЖИВАННЯ

До складу **ЛІВОДІНОЛ®** входять S-аденозил-L-метіонін (з S-аденозил-L-метіонін дисульфату тосилату) (в червоних кишковорозчинних капсулах), N-ацетилцистеїн та глутатіон (в білих кишковорозчинних капсулах).

СПОСІБ СПОЖИВАННЯ ТА РЕКОМЕНДОВАНА ДОБОВА ПОРЦІЯ

Дорослим - по 1 червоній капсулі зранку за 30 хвилин до їди або через 1 годину після їди та по 1 білій капсулі ввечері, незалежно від прийому їжі, запиваючи достатньою кількістю води. Не перевищувати рекомендовану добову порцію. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

- Перед споживанням рекомендовано проконсультуватися з лікарем.
- Не рекомендовано вагітним жінкам, жінкам у період лактації, а також дітям до 18 років.
- Не рекомендовано при індивідуальній непереносимості компонентів.

ФОРМА ВИПУСКУ

Червоні капсули з масою вмісту 520 мг ± 7,5 %.
Білі капсули з масою вмісту 650 мг ± 7,5 %.
Інформація про кількість капсул в упаковці: зазначено на упаковці.
Краще спожити до кінця: зазначено на упаковці.
Номер партії та дата виробництва: зазначено на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в оригінальній упаковці в сухому, захищеному від світла і недоступному для дітей місці за температури від 4 °С до 25 °С.

Додаткову інформацію можна отримати по телефону: (044) 454-0-100 або на сайті www.nutrimed.ua

Виробник: ТОВ "НУТРІМЕД"

Центральний офіс:
вул. Предславинська, 43/2, Київ, 03150, Україна
тел.: +380 44 454 01 01, www.nutrimed.ua, info@nutrimed.ua

Адреса потужностей виробництва:
вул. Центральна, 1, с. Сунки, Черкаський район
Черкаська область, 20741, Україна

Не є лікарським засобом